

NEBO HIERCHONTICUS (Simon, 1872) • ŠTÍR JERIŠSKÝ

akva tera fórum

Čeleď: Scorpionidae (štiroviti), podčeleď Diplocentrinae

Řád: Scorpiones (štíři)

Výskyt: Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Palestina, Sýrie

Velikost: až 120 mm (měřeno bez klepet)

Pohlavní rozdíly: Samec má jinak zoubkované prsty klepet, takže i pokud je přiloží k sobě, zůstává mezi nimi u kořene otvor.

Chov a odchov: Terárium vyhovuje polosuché, teplota může kolísat mezi 25 a 30 °C. Vhodný je noční pokles. Štíři je vhodnější chovat samostatně, ale je možný i společný chov. Jako krmivo vyhovují cvrčci nebo svábi. Potravu štíři přijímají v menším množství, a tak je nutné počítat s delší dobou vývoje. Výhodou je však dlouhověkost. Máme stále v chovu jednu samici, kterou chytily pan Votýpková v Izraeli 20. března 1998 ve velikosti necelých tří centimetrů. Čtvrté svalékání absolvovala 1. července 1998, a to měřila 38 mm, po pátém svalékání 13. března 1999 měřila 55 mm, po šestém 30. července 1999 měřila 67 mm, po sedmém 20. března 2000 měřila 87 mm a po dospělostním osmém svalékání 7. února 2001 měří okolo 110 mm a stále se jí dobré daří. Pokud předpokládáme, že se tato samice, která je i na fotografii, narodila na jaře roku 1997, je její dnešní věk již 8 let. V chovu jsem měl také jedno mládě příbuzného druhu *Nebo yemenensis*, které dospělo zhruba za 18 měsíců po sedmi svalékáních. První svalékání 12 dnů po narození, druhé 26. den, třetí 88., čtvrté 258., páté 339., šesté 435. a sedmé 546 den.



František Kovařík